



Drs. Donlevy, Estess and Lohiya

Oral and Maxillofacial Surgery • Dental Implants

SOUTH BAY

1072 Aviation Boulevard
Hermosa Beach, CA 90254
(310) 318-3333
Fax (310) 798-2566

WESTCHESTER

8540 S. Sepulveda Blvd., Ste. 709
Los Angeles, CA 90045
(310) 337-0007
Fax (310) 337-9657

CULVER CITY

10100 Culver Blvd., Ste. C
Culver City, CA 90232
(310) 559-9490
Fax (310) 559-3083

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS SENOS PARANASALES

Debido a que existe una estrecha relación entre los dientes superiores y nuestros senos, se puede desarrollar una comunicación después de la extracción de estos dientes. El hueso entre los dientes superiores y el seno es generalmente delgado y a veces inexistente. Hay una membrana (capa de tejido) que recubre el seno y lo separa de los dientes. Su médico ha determinado que después de la extracción de su diente, ahora existe una comunicación. En la mayoría de los casos, seguir cuidadosamente las instrucciones a continuación ayudará en su curación. Pero existe la posibilidad de que se requiera un segundo procedimiento para cerrar una comunicación persistente. Te pedimos que:

- ❖ Tome todas las recetas según las indicaciones
- ❖ Abstenerse de sonarse la nariz con fuerza durante 14 días
- ❖ Trate de no estornudar; causará presión sinusal indebida. Si lo hace, intente mantener la boca abierta
- ❖ No use una pajita para tomar líquidos durante 14 días
- ❖ Abstenerse de enjuagarse vigorosamente la boca durante 14 días
- ❖ Coma solo alimentos blandos durante varios días y mastique su comida en el lado opuesto si es posible

El sangrado leve de la nariz en el lado de la extracción no es inusual. El uso del tabaco es perjudicial para la curación. En el caso de una comunicación sinusal, fumar retrasará o interferirá con la curación. Le hemos programado una cita de seguimiento en una semana. Por favor, asegúrese de ponerse en contacto con nuestra oficina si no puede asistir a esta cita, ya que es necesario un seguimiento cercano.